



Maxforce[®] LN

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren buitenshuis. Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

De lokstof in het middel is gebaseerd op suiker. De mieren eten hiervan en geven het middel door binnen de gehele mierenkolonie. De meeste mieren zullen vervolgens overlijden binnen in het nest. Het is daarom mogelijk dat er geen dode mieren worden aangetroffen waar het middel is aangebracht. Zichtbaar dode mieren kunnen eventueel na 3 tot 4 dagen worden waargenomen. Het mierenest zal na 7 tot 14 dagen zijn uitgerooid.

Dosering:

Identificeer het mierenest indien mogelijk. Gebruik 8 gram korrels per nest (8 gram komt overeen met 14 ml van de bijgevoegde maatbeker). Strooi de korrels in de nestingen en in de naden en kieren waar de mieren lopen. Indien de mieren verschijnen uit meerdere nestingen, het middel gelijkmatig over deze ingangen verdelen.

Toepassing herhalen indien na 24 uur al het middel is meegenomen door de mieren. Pas het middel niet toe als regen binnen 24 uur wordt verwacht.

Gevarenaanduiding:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregel:

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Chargennummer: zie verpakking
Productie datum: zie verpakking
Houdbaarheid: tot 36 maanden na productie

Maxforce LN - NL - 2,5 kg - NL79280882C - ARTICLE 79302851



Toelatingshouder:

Bayer Cropscience SA-NV
Postbus 231
3640 AE MIJDRECHT (NL)
tel. 0297-280666

Distributeur:

Bayer S.A.S.
Bayer Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair - CS 90106
69266 LYON CEDEX 09 - FRANCE

Bayer