



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toelatingsnummers: XXXXXX
 Werkzame stof: imidacloprid
 Gehalte: 0,03%
 Aard van het preparaat: lokmiddel (klaar voor gebruik)

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van mieren, inclusief de farao mier, de spookmier en de Argentijnse mier, zowel binnen als buiten.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen:

Het middel is bijzonder effectief tegen faraomieren (*Monomorium phraonis*) en de zwartbruine wegmier (*Lasius niger*). Andere (exotische) mieren die met het middel kunnen worden bestreden zijn de spookmier (*Tapinoma melanocephalum*) en de Argentijnse mier (*Linepithema humile*).

Maxforce Quantum is door zijn visceuze eigenschappen geschikt voor het uitzetten als lokaas, in o.a. de volgende situaties:

Opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten	Huishoudens, restaurants inclusief keukens, slachthuizen, opslagplaatsen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden, gemeentehuizen, bioscopen etc.
Buiten	Zoals op terrassen, stoepen, toegangen tot schuur en garages etc. Niet toepassen op grond, gazon of tussen beplantingen.

Maxforce Quantum cartridges dienen te worden gebruikt met behulp van hiervoor geschikte pistolen. Als een cartridge slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, deze uit het pistool verwijderen en afsluiten met de bijgevoegde afsluiting.

Toepassing:

Breng het middel aan op plaatsen buiten het bereik en zicht van kinderen en (huis) dieren.

Bij gebruik **binnen**, bewoners aangeven dat schoonmaken en verwijderen van lokaas punten moet worden voorkomen.

Breng het middel aan op of naast de looppaden van de mieren.

Bij grote infestaties, dienen de lokaaspunten regelmatig te worden gecontroleerd en verversd daar waar nodig. Voorkom het aanbrengen van het middel op zeer stoffige, vochtige of vette plaatsen of plaatsen die veelvuldig worden gewassen. Breng het middel niet aan op oppervlakten waar voedsel wordt bereid, of op oppervlakten die recent zijn behandeld met andere insecticiden of waar het lokaas kan worden vervuild met andere insecticiden.

Dosering binnen: 1 druppel per vierkante meter, bijv. behandel een keuken van 10 m² met 10 druppels of 1 druppel per strekkende meter van een mieren looppad.

Bij gebruik **buiten**, kan het middel worden aangebracht in naden en kieren (op muren, tussen tegels etc.) daar waar de mieren actief zijn of waar duidelijke looppaden te zien zijn. Bij voorkeur dient het middel te worden aangebracht op plaatsen die zijn afgeschermd van regen. Als een onbeschutte plaats moet worden behandeld, dit alleen doen als geen regen binnen 24 uur wordt verwacht. In het geval er toch regen valt binnen 24 uur, de toepassing herhalen. Als de mieren nest ingangen zichtbaar zijn, het lokaas bij voorkeur rechtstreeks in deze ingangen aanbrengen.

Dosering buiten: Indien mogelijk, 2 gram van het middel rechtstreeks in het nest aanbrengen.

Voor het aanbrengen op de looppaden, geldt 1 druppel per strekkende meter met een maximum van 2 gram (=10 druppels) per nest. Na tot 7 dagen controleren of er nog voldoende middel beschikbaar is. Indien het lokaas volledig is verdwenen en de plaag onvoldoende bestreden is, dient de toepassing te worden herhaald.

Een eerste effect op de mierenpopulatie kan worden verwacht 7 dagen na aanbrengen van het middel. De meeste mieren nesten zullen na 14 dagen zijn uitgeroeid. Echter onder bepaalde omstandigheden, zoals bij erg grote nesten of bij her-infestatie, kan het plaagdierbeheersingsprogramma 2 maanden duren. Aangebrachte lokaas punten blijven ten minste 12 weken effectief. Zo lang lokaaspunten op de juiste plaats aanwezig zijn, zal herinfestatie worden voorkomen.

Toelatinghouder:
 Bayer CropScience BV
 Postbus 231
 3640 AE MIJDRECHT (NL)
 tel. 0297-280666

Maxforce Quantum - NL - Leaflet - NLxxxxxxxx - ARTICLE 79293941

Distributeur:
 Bayer Environmental Science SAS
 16 rue Jean-Marie Leclair
 F-69009 LYON (F)



Bayer Environmental Science
 A Business Operation of Bayer CropScience